

BIMECTIN[®] PASTA

Ivermectina en pasta con sabor a manzana para uso en equinos

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Bimectin[®] Pasta ejerce un tratamiento y control efectivo de los parásitos gastrointestinales en los caballos, tales como: grandes estróngilos (adultos), pequeños estróngilos (adultos, incluyendo a los resistentes a los bencimidazoles y las L4), los ascáridos (adultos, L3 y L4), Trichostrongilosis (*Trichostrongylus axei*, adultos), gusanos del estómago (adultos), *Habronema muscae* (adultos), larvas de *Gasterophilus* (estadios orales y gástricos), parásitos pulmonares (adultos y L4), Estrongiloidosis Intestinal (*Strongyloides westeri*, adultos), la llaga de verano o estival y dermatitis causada por microfilarias de *Onchocerca*. Consulte a su Médico Veterinario para el diagnóstico, tratamiento y control de las parasitosis.

BENEFICIOS

- **Efectividad:** Contiene ivermectina que es efectivo contra helmintos y larvas parasitarias de moscas.
- **Amplio espectro:** Activo contra un amplio rango de parásitos que debilitan y reducen el rendimiento de los animales.
- **Palatabilidad:** Con sabor a manzana que le da excepcional aceptación.
- **Versátil:** Para uso en equinos en todas las edades, incluyendo hembras en cualquier etapa de gestación.
- **Aro de seguridad:** La jeringa tiene un aro de seguridad para una manipulación segura.
- **Seguro:** Aprobado por la FDA.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

BIMECTIN® PASTA



Invermectina en pasta con sabor a manzana para uso en equinos

INTRODUCCIÓN

Es muy importante que los equinos tengan un programa de control de parásitos, con particular énfasis en yeguas, potrillos y potros de un año. Los potrillos se deberán desparasitar de las 6 a 8 semanas de edad y repetir los tratamientos de acuerdo con la incidencia de las parasitosis. Consulte a su Médico Veterinario para el establecimiento de un programa de desparasitación acorde a sus necesidades. **Bimectin® Pasta** es efectivo para el tratamiento y control de los nematodos gastrointestinales y de las larvas de moscas (estadios parasitarios). Un calendario de desparasitación adecuado y rutinario, reduce las posibilidades de la presencia de la arteritis verminosa causada por *Strongylus vulgaris*.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bimectin® Pasta es un antihelmíntico en pasta que contiene como ingrediente activo ivermectina al 1.87 %, un antiparasitario de la familia de las lactonas macrocíclicas, que es efectivo en el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y larvas de moscas (estadios parasitarios). Además se le ha agregado un agradable sabor a manzana para incrementar la palatabilidad.

FÓRMULA

Cada jeringa de 6.4 g contiene:
ivermectina: 120.00 mg

INDICACIONES

Bimectin® Pasta ejerce un tratamiento y control efectivo de los parásitos gastrointestinales en los caballos, tales como: grandes estróngilos (adultos), pequeños estróngilos (adultos, incluyendo a los resistentes a los bencimidazoles y las L4), los ascáridos (adultos, L3 y L4), Tricostrogilosis (*Trichostrongylus axei*, adultos), gusanos del estómago (adultos), *Habronema muscae* (adultos), larvas de *Gasterophilus* (estómago orales y gástricos), parásitos pulmonares (adultos y L4), Estrongiloidosis Intestinal (*Strongyloides westeri*, adultos), la llaga de verano o estival y dermatitis causada por microfilarias de *Onchocerca*. Consulte a su Médico Veterinario para el diagnóstico, tratamiento y control de las parasitosis.

MECANISMOS DE ACCIÓN

La ivermectina pertenece al grupo de las lactonas macrocíclicas, de la familia de los endectocidas, que tiene un modo de acción muy particular. Los compuestos de este grupo se unen selectivamente y con una alta afinidad a los canales del ion cloro controlados por el glutamato, que se encuentra presente en los nervios y células musculares de los invertebrados; esto provoca un incremento de la permeabilidad de la membrana celular a los iones de cloro, con una hiperpolarización del nervio o célula muscular, lo que da como resultado la parálisis y muerte del parásito. Los compuestos de esta clase también interactúan con otras vías relacionadas con los canales de cloro, tales como las controladas por el neurotransmisor ácido gamma aminobutírico (GABA). El margen de seguridad de esta clase de compuestos se atribuye al hecho de que los mamíferos no tienen los canales de cloro controlados por el glutamato.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

El contenido de una jeringa de **Bimectin® Pasta** es suficiente para tratar un caballo de 600 Kg a la dosis recomendada de 200 µg/Kg de peso. Cada marca del émbolo de la jeringa proporciona suficiente pasta para tratar 100 kg de peso.

1. Mientras sostiene el émbolo, de un cuarto de vuelta al aro graduado para la izquierda en el émbolo y deslícelo de tal manera que el cilindro quede en la marca del peso a tratar.
2. Asegure el aro en su lugar girando un cuarto de vuelta a la derecha.
3. Asegúrese de que el caballo no tenga alimento en la boca.
4. Retire la tapa de la punta de la jeringa.

5. Coloque la punta de la jeringa en la boca del caballo, en el espacio entre los dientes.
6. Empuje completamente el émbolo, procurando depositar la pasta atrás de la lengua.
7. Levante la cabeza del caballo por unos segundos para asegurarse que lo degluta.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en caballos destinados consumo humano.

ADVERTENCIA:

En caballos con infestación severa de microfilaria de *Onchocerca*, en el cuello puede haber inflamación y comezón después de la administración de **Bimectin® Pasta**, pero esta reacción se debe más a la gran cantidad de microfilarias que se están muriendo en los tejidos, que por el efecto propio de la ivermectina. Se recomienda en este caso un tratamiento sintomático. La curación de la llaga de verano, que involucra extensas áreas de tejidos dañadas, requerirá de una terapia concomitante junto con la desparasitación. Se deben tomar en cuenta las re-infestaciones y sus medidas preventivas. Manténgase lejos del alcance de los niños. Evite fumar o comer durante el manejo del producto. Lávese las manos inmediatamente después de usar el producto. Evite el contacto con los ojos.

PRECAUCIONES

Bimectin® Pasta esta formulado para uso exclusivamente en caballos. Este producto no debe ser utilizado en otras especies animales debido a que puede provocar fuertes reacciones secundarias, pudiendo provocar la muerte en perros.

La ivermectina y sus metabolitos pueden causar efectos adversos en organismos acuáticos. Deseche las jeringas en recolectores aprobados o por incineración.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura menor de 30°C.
Protéjase de la luz solar directa.

No apto para uso en humanos.

Manténgase lejos del alcance de los niños.

Consulte a su Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN

Jeringa 6.42 gramos

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN BIMEDA

Email: suramerica@bimeda.com
www.bimedasuramerica.com

PAÍS	REGISTRO
ECUADOR	3A-3B-14403-AGROCALIDAD
PERU	F.08.43.1.0891
BOLIVIA	SENASAG PUV.F no. 006026/14
URUGUAY	A-4289

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimedasuramerica.com

Bimectin® Paste es una marca registrada de Bimeda, Inc.