

DORACIDE

Doramectina 1%

FICHA
TÉCNICA




INDICACIONES

Doracide está indicado para el tratamiento, prevención y control de parásitos internos y externos de los bovinos:

- **Parásitos gastrointestinales:** en las formas adultas de *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformes*, *Cooperia pectinata*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Cooperia punctata* y *Trichuris discolor*.
- **Larvas:** larvas de *Dermatobia hominis*.
- **Garrapata:** *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.
- **Miasis:** prevención de las "gusaneras" causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

BENEFICIOS

- Endectocida de amplio espectro.
- Alta eficacia.
- Doracide puede ser administrado con seguridad en bovinos jóvenes y adultos, inclusive terneros y hembras preñadas.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

DORACIDE

Doramectina 1%



INTRODUCCIÓN

Doracide es un endectocida a base de Doramectina al 1% para uso en bovinos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Doramectina es una lactona macrocíclica obtenida por biosíntesis de una mutación, en la cual el precursor (ácido ciclohexano carboxílico) fue adicionado a una cepa mutante de *Streptomyces avermitilis* obteniéndose una avermectina que difiere de ivermectina en su estructura química, por la presencia de un núcleo ciclohexilo a nivel de C25. La Doramectina tiene actividad contra endoparásitos y ectoparásitos, específicamente nematodos y artrópodos. Además de tener actividad de amplio espectro, es efectiva a muy bajas concentraciones y generalmente presenta baja toxicidad en mamíferos.

Es un fármaco muy liposoluble, lo que se relaciona con una extensa distribución por los diferentes tejidos del organismo. Alcanza elevadas concentraciones en tejidos de localización parasitaria, como las mucosas abomasal e intestinal, la piel y el tejido pulmonar.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de Doracide contienen:

Doramectina	1.0 g
Excipientes c.s.p	100.00 mL

INDICACIONES

Doracide está indicado para el tratamiento, prevención y control de parásitos internos y externos de los bovinos:

- **Parásitos gastrointestinales:** en las formas adultas de *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformes*, *Cooperia pectinata*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Cooperia punctata* y *Trichuris discolor*.
- **Larvas:** larvas de *Dermatobia hominis*.
- **Garrapata:** *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.
- **Miasis:** prevención de las "gusaneras" causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Doracide debe ser administrado por vía subcutánea en las dosis recomendadas de preferencia atrás de la paleta.

Bovinos: aplicar la dosis de 1 mL por cada 50 kg de peso, lo que equivale a 200 µg de Doramectina por kg de peso vivo.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 31 días después de finalizado el tratamiento.

Este producto no debe aplicarse a hembras productoras de leche para el consumo humano.

CONTRAINDICACIONES

- No aplicar el producto en vacas productoras de leche para el consumo humano.
- No aplicar en animales con hipersensibilidad conocida a los principios activos del producto.
- No aplicar en animales enfermos, débiles, estresados o cansados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Mantener el empaque cerrado y protegido de la luz directa y calor. Obedecer las dosificaciones y recomendaciones para uso del producto.

Aplicar el producto únicamente por vía subcutánea.

No coma, no beba y no fume durante la manipulación del producto.

No contamine depósitos de agua de cualquier naturaleza.

No apto para uso en humanos.

Manténgase lejos del alcance de los niños.

Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta.

Consulte a su Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura menor de 30°C.

Protéjase de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

Frascos de 50 mL, 250 mL y 500 mL.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA

Email: suramerica@bimeda.com

www.bimedasuramerica.com

PAÍS	REGISTRO
BOLIVIA	SENASAG PUVF no.008121/17
ECUADOR	3A-18197-AGROCALIDAD
PERU	F.09.01.I.0411
PARAGUAY	Reg.SENASA N°17797

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimedasuramerica.com