

MEGACAL-M

SOLUCIÓN INYECTABLE

Calcio, Magnesio y Fósforo

FICHA
TÉCNICA



INDICACIONES

Para el tratamiento en bovinos en las siguientes condiciones:

- Parésia por hipocalcemia antes, durante y después del parto, incluso durante la lactancia (fiebre de leche).
- En síndrome de vaca caída (incluso durante la preñez) causado por enfermedad o disfunción de la secreción interna.

BENEFICIOS

- Restaura los niveles de Calcio en sangre en caso de hipocalcemia e incrementa los niveles de Magnesio.
- Baja cantidad de aplicación para corregir la deficiencia.
- Cero tiempo de retiro en leche.
- Alta concentración de Calcio para administración intravenosa y subcutánea.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

MEGACAL-M

SOLUCIÓN INYECTABLE

Calcio, Magnesio y Fósforo



INTRODUCCIÓN

Solución a base de calcio, fósforo y magnesio de uso parenteral indicado en bovinos para el tratamiento de hipocalcemia o fiebre de leche ocasionada por una marcada disminución del calcio sérico en vacas durante el parto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución inyectable, estéril, amarilla pálido.

Para el tratamiento de hipocalcemia y aumentar los niveles de Magnesio en sangre.

FÓRMULA

Calcio (Como Borogluconato de Calcio 550 mg) equivalente a 4.06g/100mL.

Magnesio (Como Hipofosfito de Magnesio) equivalente a 0.8g/100mL.

Fósforo (Como Hipofosfito de Magnesio) equivalente a 0.02 g/100mL

INDICACIONES

Para el tratamiento en bovinos en las siguientes condiciones:

- Paresia por hipocalcemia antes, durante y después del parto, incluso durante la lactancia.
- En vaca caída (incluso durante la preñez) causado por enfermedad o disfunción de la secreción interna.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administre por inyección subcutánea o intravenosa lenta, usando la técnica aséptica.

Se sugiere una dosis de 100 mL/500 Kg de peso vivo por vía intravenosa lenta, seguida de 100 mL/ 500 kg de peso vivo por vía subcutánea.

PERÍODO DE RETIRO

0 horas de tiempo de retiro en leche y carne.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

La solución deberá ser calentada a temperatura corporal antes de usar.

Evite su uso en casos conocidos de hipersensibilidad a los ingredientes y en casos conocidos de arritmia cardiaca o toxemia severa.

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Para tratamiento animal únicamente

Este producto no contiene preservativos.

Deseche cualquier solución no usada.

Si algún aparente crecimiento o decoloración ocurre el producto deberá ser desechado.

PRESENTACIONES

Frasco de vidrio por 100 mL

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura menor de 30°C.

Protéjase de la luz solar directa.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA

Email: suramerica@bimeda.com

www.bimedasuramerica.com

PAÍS	REGISTRO
BOLIVIA	SENASAG PUV.F no. 002589/08
COLOMBIA	7782MV

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimedasuramerica.com