

TETROXY® LA

Oxitetraciclina inyectable para uso veterinario

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Tetroxy®LA, está indicado para su uso en tratamiento de enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina en ganado de engorda, ganado lechero no lactante, becerros, incluyendo becerros lactantes y en cerdos. Es un producto de larga acción; una sola inyección proporciona tres días de cobertura antibiótica.

BENEFICIOS

- **Práctico:** Generalmente un tratamiento es suficiente, lo que reduce el trabajo y el número de sitios de inyección.
- **Amplio espectro:** Tratamiento efectivo contra enfermedades causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la fórmula.
- **Listo para su uso:** No requiere reconstituirse ni refrigerarse.
- **Alta solubilidad:** Fácil aplicación aún a temperaturas bajas.
- **Versatilidad:** Terapia antimicrobiana probada para un amplio rango de especies.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis



TETROXY®LA

Oxitetraciclina inyectable para uso veterinario



INTRODUCCIÓN

Tetroxy®LA está formulado con oxitetraciclina clorhidrato, un antibiótico de amplio espectro con fuerte actividad frente a la mayoría de las bacterias Gram positivas y Gram negativas, algunos protozoarios, rickettsias, mycoplasma y clamidias. Es una solución estable preparada especialmente para que tras su aplicación, los niveles sanguíneos del fármaco persistan durante un período de 3 a 5 días.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tetroxy®LA es una solución estéril, lista para usarse, que contiene: 200 mg de oxitetraciclina clorhidrato por cada mililitro de excipientes c.s.p.

FÓRMULA

Oxitetraciclina clorhidrato 200 mg
Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES

Tetroxy®LA, está indicado para su uso en tratamiento de enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina en ganado de engorda, ganado lechero no lactante, becerros, incluyendo becerros lactantes y en cerdos.

Bovinos: Tetroxy®LA está recomendado para el tratamiento de neumonías y Fiebre de Embarque asociado con *Pasteurella spp.* y *Haemophilus spp.*; Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina (ojo rosado) causado por *Moraxella bovis*, Pododermatitis Infecciosa y Difteria causada por *Fusobacterium necrophorum*; enteritis bacteriana (diarreas) causada por *Escherichia coli*; Lengua de Madera causada por *Actinobacillus lignieresii*; Leptospirosis producida por *Leptospira pomona*; además de metritis aguda e infecciones de heridas causadas por cepas de estreptococos y estafilococos sensibles a las oxitetraciclinas.

Porcinos: Se recomienda el uso de **Tetroxy®LA** para el tratamiento de la enteritis bacteriana provocada por *Escherichia coli* (Colibacilosis); neumonías por causa de *Pasteurella multocida* y Leptospirosis causada por *Leptospira pomona*. **Tetroxy®LA** se indica como apoyo en el control de enteritis (Colibacilosis) en lechones provocada por *Escherichia coli*. También es útil para el tratamiento del síndrome MMA e infecciones postoperatorias.

MECANISMO DE ACCIÓN

Las tetraciclinas ejercen su acción inhibiendo la síntesis de proteínas en la bacteria. Este grupo de antibióticos evita la unión de la molécula ARN de transferencia (ARNt) (una clase de ácido nucleico que tiene la función de transportar aminoácidos) a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Este mecanismo de acción evita que los aminoácidos se unan a la cadena de péptidos.

Las tetraciclinas tienen también la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas en el paciente, pero no es probable que alcancen la concentración requerida, ya que las células eucarióticas no tienen mecanismo de absorción de las tetraciclinas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: Tetroxy®LA

Se recomienda una dosis única de 1 mL por cada 10 Kg de peso (equivalente a 20 mg por Kg de peso) por vía intramuscular.

Porcinos: Se recomienda una sola dosis de **Tetroxy®LA** de 1 mL por cada 10 Kg de peso (20 mg por cada Kg de peso) por vía intramuscular.

Ovinos y Caprinos: Administrar 1 mL para cada 10 kg de peso, equivalente a 20 mg por kg de peso. En animales con más de 50 kg de peso se recomienda dividir la dosis en 2 lugares de aplicación.

PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

No se debe suministrar en vacas lactantes durante su producción.

CONTRAINDICACIONES

No usar en gatos, perros, caballos y monos.

ADVERTENCIA

No usar en vacas en producción.

La administración intravenosa rápida puede provocar que el animal entre en choque.

La aplicación intramuscular de las oxitetraciclinas debe ser lenta.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente puede ocurrir una reacción local de naturaleza transitoria en el sitio de aplicación.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura menor de 25°C.

Protéjase de la luz solar directa.

PRESENTACIONES

50 mL, 100 mL y 250 mL

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consulte a su Médico Veterinario.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA

Email: suramerica@bimeda.com

www.bimedasuramerica.com

PAÍS	REGISTRO
ECUADOR	2C1-18209-AGROCALIDAD
PARAGUAY	Paraguay Reg.SENACSA N°16.933
PERÚ	F.82.01.I.0061

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimedasuramerica.com Tetroxy®LA es una marca registrada de Bimeda, Inc.